

5-ти ЛЕТНИЙ ОПЫТ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
НЕФРЭКТОМИЙ:
800 наблюдений.

М.О. Воздвиженский, *д.м.н., профессор*

А.Л. Горбачев, *к.м.н.*

А.Ю. Трубин

Актуальность проблемы

- В структуре онкологической заболеваемости рак почки занимает **10-е место** среди всех злокачественных новообразований.
- Заболеваемость составляет **2-3%** от всех злокачественных новообразований и имеет тенденцию к росту (прирост показателя за 10 лет в России **42,3%**, в Самарской области – **30,2%**).
- Кроме улучшения выживаемости пациентов, большое значение при выборе метода лечения имеет качество жизни, что обуславливает **необходимость внедрения малоинвазивных технологий**.

Цель
исследования:

- **оценить клиническую эффективность лапароскопической нефрэктомии при раке почки (опыт одного центра).**

Задачи
исследования:

- оценить общую, специфическую и безрецидивную **выживаемость больных** раком почки;
- **сравнить** интра- и послеоперационные **результаты** лапароскопической и открытой нефрэктомии;
- **оценить качество жизни** пациентов после лапароскопического и открытого вмешательства;
- **уточнить показания** к лапароскопической нефрэктомии.

Хирургическое
лечение
рака почки
в Самарском
онкологическом
диспансере,
2010 - 2015 г.г.

Название операции	Количество операций
Нефрэктомия, лапароскопический доступ	802 (64,2%)
Нефрэктомия, лапаротомный доступ	447 (35,8%)
Всего:	1249 (100%)

Хирургическое
лечение
рака почки
в Самарском
онкологическом
диспансере,
2010 - 2015 г.г.

Распростра- ненность процесса	Нефрэктомия, лапароскопи- ческий доступ	Нефрэктомия, лапаротомный доступ	Всего:
T1N0M0	627 (81%)	143 (19%)	770 (100%)
T2N0M0	88 (48%)	95 (52%)	183 (100%)
T3aN0M0	95 (40%)	141 (60%)	236 (100%)

Интра-
операционные и
после-
операционные
результаты
хирургического
лечения
рака почки

	ЛНЭ	ОНЭ	p
Количество операций	802	447	
Средняя длительность вмешательства, (мин.)	94±6,1	112±4,6	0,000
Средний объем кровопотери, (мл.)	55±5,6	360±10,1	0,000
Послеоперационный койко-день, (сут.)	9,7±1,1	14,6±1,6	0,000
Количество осложнений	8	12	0,065

Отдаленные
онкологические
результаты
хирургического
лечения
рака почки

	ЛНЭ	РНЭ	p
Средний период наблюдения	40,3±4,5	40,1±5,5	
5-летняя выживаемость, (%)			
Общая	87,8	85,7	0,513
Рак-специфическая	93,9	88,5	0,910
Безрецидивная	84,8	85,7	0,842

Выводы:

- лапароскопическая нефрэктомия имела значимо **лучшие показатели** качества жизни (длительность операции, объем кровопотери, послеоперационный койко-день);
- применение лапароскопического доступа при выполнении радикальной нефрэктомии больным раком почки имело сопоставимые онкологические результаты при сравнении с открытым доступом (специфическая 5-ти летняя **выживаемость составила 93,9% и 88,5%** соответственно);
- при раке почки в стадии T3aN0M0 методом выбора является **лапароскопическая операция.**

Благодарим за внимание!

